



ZARGREEN

برنامه غذایی سیب زمینی با محصولات زرگرین

| درشت شدن غده | غده زنی | استولن زایی | رشد رویشی | چند برگی | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار | آبکود، ۶-۴۰ لیتر در هکتار محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار | آبکود، ۶۰-۴۰ لیتر در هکتار محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار | | آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار | آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه) |
| | | آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار | | آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار | NPK 13 13 13 (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه) |
| | آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار | | آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار | | گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه) |
| | | | آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار | آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار | N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه) |
| | | آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار | | | P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه) |
| محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار | محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار | | | | K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه) |
| | محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار | محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار | | | PK40 (کود فسفر پتاسیم بالا حاوی بور و مولیبدن) |
| | | | محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار | | فسفیت پتاسیم (کود فسفیت پتاسیم حاوی اسیدهای آمینه) |
| | محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار | محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار | | | کلسیم بور (کود کلسیم بور حاوی اسیدهای آمینه) |
| | محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار | | محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار | | میکرو میکس (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه) |

- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.
- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.
- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

