



ZARGREEN

برنامه غذایی جبوهات با محصولات زرگرین

غلاف بندی	قبل از گلدهی	۶ برگی	دو برگی	
آبکود، ۴ لیتر در هکتار محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۳۰ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار		آبکود، ۲۰ لیتر در هکتار		NPK 13 13 13 (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار		گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۱۰ لیتر در هکتار		N2O (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار		آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار	P2O (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار				K2O (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار			PK40 (کود فسفر پتاسیم بالا حاوی بور و مولیبدن)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			کلسیم بور (کود کلسیم بور حاوی اسیدهای آمینه)
	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			فروت ست (نیتروژن، روی و بور به همراه اسیدهای آمینه)
		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		میکرو میکس (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف یسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجبوب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می‌باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

