



ZARGREEN

برنامه غذایی انگور با محصولات زرگرین

پس از برداشت	شروع رنگ دهی	غوره	ارزنى شدن میوه	تشکیل میوه	قبل از گلدهی	تورم جوانه	
محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار		محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	آبکود، ۸۰-۶۰ لیتر در هектار محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	آبکود، ۸۰-۶۰ لیتر در هектار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هزار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
آبکود، ۲۰-۳۰ لیتر در هектار			آبکود، ۴۰-۳۰ لیتر در هектار	آبکود، ۲۰-۳۰ لیتر در هектار	آبکود، ۲۰-۳۰ لیتر در هектار		NPK 13 13 13 (عنصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵ لیتر در هектار			آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هектار	آبکود، ۱۰ لیتر در هектار		N2O (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هектار			آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هектار				P2O (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار				K2O (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۳ لیتر در هزار			محلول پاشی، ۳ لیتر در هزار			محلول پاشی، ۳ لیتر در هزار	PK40 (کود فسفر پتاسیم بالا حاوی بور و مولیبدن)
محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار					محلول پاشی، ۴ لیتر در هزار		فروت ست (نیتروژن، روی و بور به همراه اسیدهای آمینه)
	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هزار			کلسیم بور (کود کلسیم بور حاوی اسیدهای آمینه)
			محلول پاشی، ۴ لیتر در هزار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هزار			میکرو میکس (عنصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)



۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.