



ZARGREEN

## برنامه غذایی برنج با محصولات زرگرین

الخمیری شدن دانه	ساقه دهی	اواسط پنجه زنی	اوایل پنجه زنی	بعد از انتقال نشاء	خزانه	
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۳۰ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴۰-۳۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۱ لیتر در هکتار	آبی ارگانیک مایع (کود آبی حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۲۵-۲۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۲۵-۲۰ لیتر در هکتار		NPK 13 13 13 (عنصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار				گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار				N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار			P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار				K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۳-۲ لیتر در هکتار					B10 (بور اتانول آمین)
	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار				میکرو میکس (عنصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صحیح زود یا غروب می‌باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

