



ZARGREEN

برنامه غذایی ذرت با محصولات زرگرین

شیری شدن دانه	ظهور بلال	قبل از ظهور گل آذین نر (تاسل)	اوایل ساقه دهی	۴-۶ برگگی	
آبکود، ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰ لیتر در هکتار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۳۰-۴۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰ لیتر در هکتار		NPK 13 13 13 (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار			آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار	گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۳۰-۴۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰ لیتر در هکتار		N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
آبکود، ۲۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار			P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۲-۳ لیتر در هکتار		B10 (بور اتانول آمین)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار		K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		میکرو میکس (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید گاسته می‌شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

