



ZARGREEN

برنامه غذایی چغندر قند با محصولات زرگرین

اواسط غده زنی	تشکیل غده	۱۰-۱۲ برگی	۶-۸ برگی	۴-۶ برگی	
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۶۰-۴۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۶۰-۴۰ لیتر در هکتار محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۳۰ لیتر در هکتار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	NPK 13 13 13 (عنصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار			آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار	گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار		N2O (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار			P2O (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار				K2O (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار			PK40 (کود فسفر پتاسیم بالا حاوی بور و مولیبدن)
	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	فسفیت پتاسیم (کود فسفیت پتاسیم حاوی اسیدهای آمینه)
	محلول پاشی، ۱-۰.۵ لیتر در هکتار				B10 (بور اتانول آمین)
	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		میکرو میکس (عنصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک یا مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می‌باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوا گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

