

برنامه غذایی کلزا با محصولات زرگرین

اواسط غلاف بندی	ابتدای تشکیل غلاف	۵۰ درصد گلدهی	ابتدای گلدهی	ساقه دهی	
	آبکود، ۴۰-۵۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۵۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۳۰-۴۰ لیتر در هکتار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۲۰-۳۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۲۰ لیتر در هکتار	NPK 13 13 13 (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		گوگرد مایع (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
				آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار	N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار				محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار	PK40 (کود فسفر پتاسیم بالا حاوی بور و مولیبدن)
			محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		فروت ست (نیتروژن، روی و بور به همراه اسیدهای آمینه)
				محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	میکرو میکس (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

- ۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.
- ۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.
- ۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

