

## برنامه غذایی گندم و جو با محصولات زرگرین

خمیری شدن دانه	گلدھی سنبله	ساقه دهی	اواسط پنجه زنی	اوایل پنجه زنی	
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰ لیتر در هکتار	<b>آلی ارگانیک مایع</b> (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۳۰ لیتر در هکتار		آبکود، ۲۰-۲۵ لیتر در هکتار	<b>NPK 13 13 13</b> (عناصر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		<b>گوگرد مایع</b> (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
	آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار			آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار	<b>N20</b> (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۱۵-۲۰ لیتر در هکتار		<b>P20</b> (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			<b>K20</b> (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			<b>میکرو میکس</b> (عناصر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)

- ۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.
- ۲- بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا غروب می باشد که رطوبت هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.
- ۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.

