



ZARGREEN

برنامه غذایی گوجه فرنگی با محصولات زرگرین

قبل از رنگ دهنده	رشد میوه	تشکیل میوه	قبل از گلدهی	رشد رویشی	بعد از انتقال نشاء	
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۴۰-۳۰ لیتر در هکتار		محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	آبکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	آلی ارگانیک مایع (کود آلی حاوی اسیدهای آمینه)
			آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار	بکود، ۳۰-۲۰ لیتر در هکتار		NPK 13 13 13 (عنامر ماکرو به همراه اسیدهای آمینه)
		آبکود، ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار		آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار		گوجه فرنگی (کود گوگردی حاوی اسیدهای آمینه)
آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار						N20 (کود نیتروژن بالا حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۵ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			آبکود، ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار	P20 (کود فسفر بالا حاوی اسیدهای آمینه)
			محلول پاشی، ۳ لیتر در هکتار			K20 (کود پتاسیم بالا حاوی اسیدهای آمینه)
				محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		PK40 (کود فسفر پتابسیم بالا حاوی بور و مولیبدن)
						فسفیت پتابسیم (کود فسفیت پتابسیم حاوی اسیدهای آمینه)
محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار			کلسیم بور (کود کلسیم بور حاوی اسیدهای آمینه)
			محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار	محلول پاشی، ۴ لیتر در هکتار		میکرو میکس (عنامر میکرو به همراه اسیدهای آمینه)



۱- برنامه غذایی توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه و شرایط خاک با مشاوره کارشناسان مجرب منطقه تعیین می‌گردد.

۲- بهترین زمان محلول پاشی صحیح زود یا غروب می‌باشد که روابط هوا به بالاترین میزان رسیده و از شدت نور خورشید کاسته می‌شود.

۳- برای جلوگیری از گیاه سوزی، در هنگام ظهر و هوای گرم از محلول پاشی اجتناب شود.